



ОБЫКНОВЕННЫЙ ЁЖ *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758

Отряд Насекомоядные
Eulipotyphla

Семейство Ежиные
Erinaceidae

Статус. 4 категория. Редкий неизученный вид на северной границе ареала. Внесён в Красные книги Свердловской [1], Томской [2] и Тюменской [3] областей.

Признаки. В окраске меха преобладают охристые тона различной интенсивности, на боках – с желтовато-ржавым оттенком. Окраска иглистого панциря буроватая с беловатыми штрихами. С возрастом окраска становится светлее и приобретает характерную желтизну с палевым оттенком. Длина игл 25–35 мм. Уши короткие, менее 35 мм [4].

Распространение. Обыкновенный ёж распространён в Западной и Центральной Европе, Южной Скандинавии, Эстонии, в северных и центральных районах европейской части России [5]. В Западной Сибири обитают представители двух видов рода *Erinaceus* [6]. В Югре обыкновенный ёж зарегистрирован в окрестностях п. Куминский Кондинского района, хотя реально встречается шире по югу округа [4, 7, 8], а также в Уватском районе Тюменской области [9], в бассейне р. Васюган Томской области [10].

Места обитания и образ жизни. На северной границе ареала в Западной Сибири ёж сравнительно редко встречается в берёзово-осиновых лесах по гривам, ещё реже – в заболоченных смешанных массивах с преобладанием хвойных, где избирает наиболее сухие и высокие места [10]. Пищу ежа составляют различные животные, преимущественно насекомые и другие беспозвоночные, а также мелкие позвоночные животные, в том числе лягушки, ящерицы, мышевидные грызуны, яйца и птенцы гнездящихся на земле птиц. Активен ёж преимущественно в сумеречное и ночное время. День проводит в гнезде, которое устраивает под валежинами, корнями деревьев и кустарников, в естественных нишах или прямо на поверхности почвы. Гнездо большое, строится из различной растительной ветоши: травы, веток, листьев. Здесь ёж выкармливает детёнышей. Спаривание происходит весной. В течение года бывает один помёт. Самка приносит 3–8 детёнышей. Продолжительность беременности около 7 недель. Половозрелость на-

ступает на втором году жизни. Зиму проводит в гнезде, в состоянии спячки. Осенью ежи сильно жиреют и с наступлением заморозков (октябрь) их активная жизнь прерывается до весны. Просыпаются ежи после таяния снега, с прекращением ночных заморозков. Враги ежа немногочисленны. На него нападает обыкновенная лисица, волк, а из хищных птиц филин [4]. В округе биология ежа не изучена.

Численность. Сведения отсутствуют. Известны лишь единичные встречи.

Лимитирующие факторы. Недостаток пригодных мест обитания, гибель на автодорогах, влияние собак, бегающих в тайге, особенно вблизи населённых пунктов и многочисленных буровых.

Меры охраны. Запрет отлова в естественных местобитаниях, ограничение численности бродячих собак. Организация целенаправленных научных исследований популяций данного вида на северной границе ареала в Западной Сибири.

Источники информации. 1. Красная книга Свердловской области, 2008; 2. Красная книга Томской области, 2002; 3. Красная книга Тюменской области, 2004; 4. Юдин, 1971; 5. Богданов и др., 2009; 6. Стариков, 2013; 7. Лаптев, 1958; 8. Стариков, 2002; 9. Павлов и др., 2004; 10. Москвитина, 1985.

Составитель В.П. Стариков.

Фотография В.П. Старикова.

