

Появление обыкновенного шакала (*Canis aureus* L., 1758) у берегов Крыма. [Appearance of the golden jackal (*Canis aureus* L., 1758) in the ... Krimea]. В известной сводке “Млекопитающие Советского Союза. (Морские коровы и хищные)” под ред. В.Г.Гептнера и Н.П.Наумова (1967) высказывается мнение о том, что старые сведения об обитании шакала в Крыму не заслуживают внимания. Этот вид никогда не отмечали и в составе ископаемой фауны региона. В течение почти всего XX ст. шакала также не было в обширных плавнях дельты р. Кубани, где для него имелись вполне подходящие условия. Однако, согласно данных зоологов Т. Барташвили и О. Витовича, в 80-х годах XX ст. стало наблюдаться расселение этого животного из кавказского очага со скоростью около 20 км в год. Вскоре он появился в Кубанских плавнях, а один шакал по льду зимой 2001/02 гг. проник в Крым на косу Тузла в Керченском проливе. После пыльных бурь 1969/70 гг. из Кубани на косу ветром было принесено большое количество чернозёма. После этого здесь стало возможным элементарное земледелие, появились заросли узколистного лоха и сформировались тростниковые займища. Поэтому поселившийся здесь шакал нашёл вполне комфортные условия для своего проживания. Однако с первых дней хищник стал наносить местному немногочисленному населению ощутимый вред – он воровал кур и гусей, а в апреле 2002 г. задушил в загоне 26 ягнят. В результате специальной акции шакала удалось добыть – это был взрослый, нормально упитанный самец. Вскоре выяснилось, что на косе обитает ещё один зверь. Этот случай свидетельствует о потенциальной вероятности проникновения шакала в Крым. Обращает на себя внимание не только сам факт появления нового вида в фауне региона, но и то что расселение шакала из балканского, кавказского и туркменского очагов обитания началось в одно и то же время и отличалось определённой синхронностью.

А.М.Волох (Таврическая государственная агротехническая академия, г. Мелитополь)