

УДК 639.1
ББК 47.1

Биологические ресурсы. В 2 ч. Ч. 1. Охотоведение / Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Вятской государственной сельскохозяйственной академии и 45-летию подготовки биологов-охотоведов, 3–5 июня 2010 г.: Сборник научных трудов. - Киров: Вятская ГСХА, 2010. – 316с.

Главный редактор	ректор академии, профессор С.А. Жданов	
Зам. главного редактора	проректор по научной работе, профессор В.Г. Мохнаткин	
Редакционная коллегия	доктор биологических наук В.М. Козлов доктор биологических наук В.И. Машкин кандидат биологических наук А.А. Шулятьев	

В настоящее издание помещены материалы участников пленарных и секционных заседаний Международной научно-практической конференции посвященной 80-летию Вятской государственной сельскохозяйственной академии и 45-летию подготовки биологов-охотоведов.

Обсуждаются общие вопросы состояния охотничьих ресурсов в различных регионах России, их воспроизводства и использования, правовые аспекты охраны биологических ресурсов, а также основные проблемы экономики и организации охотничьего хозяйства.

ягоды: шикша субголарктическая (*Empetrum subholarcticum* V.Vassil), морошка (*Rubus chamaemorus* L.), голубика (*Vaccinium uliginosum* ssp. *microphyllum* Lange), брусника (*Vaccinium vitis-idae* L.) и другие. Объем потребления ягод на семью в среднем 26,5 кг, с колебаниями от 12,1 до 37,3 кг. Используются в пищу 4-5 видов грибов. Объемы заготовок на семью от 9,8 до 27,8 кг.

Таким образом, традиционное природопользование и система жизнеобеспечения сельских коренных жителей Чукотского полуострова направлена на максимальное использование доступных биоресурсов природы. При этом следует отметить в культуре жителей полную и комплексную утилизацию добытых продуктов. Сами населенные пункты расположены в зонах повышенной биопродуктивности. Кажется очевидной необходимость поддержки такой культуры, расширение этой поддержки и некоторая коммерциализация с целью сохранения культуры и подъема экономики в селах.

РЫСЬ В АРКТИКЕ У МЫСА ДЕЖНЕВА

Мымрин Р.Н., Мымрин Н.И.

г. Киров

nmymrin@yandex.ru

Рысь на Чукотке, согласно сведениям, представленным Ф.Б. Чернявским (1984) и сведениям из сборника «Позвоночные животные Северо-Востока России» (1996), на восток далее устья Анадырского лимана не отмечена. В сборнике «Рысь. Региональные особенности экологии...» (2003) приведены три ссылки на местных жителей о встречах рыси на Чукотском полуострове. В данном сообщении мы излагаем опросные материалы и собственные наблюдения о встречах и распределении рыси на Чукотском полуострове.

Северная часть полуострова (Чукотский район). 1) В марте 2007 г. одну рысь видели в устье р. Вытгырвеем (Мечигменская лагуна). 2) В апреле 2007 г. одну рысь видели на скалах мыса Нунямо, с восточной стороны. 3) В 2006 году одну рысь видели у лагуны Поутен - в 25 км севернее мыса Нунямо. 4) В мае-июне 2006 года зверобой наблюдали со стороны моря сразу двух (пару) рысей на мысе Дежнева, у старого эскимосского селения Наукан. 5) Ежегодно рыбаки встречают следы рыси на реке Чегитун, от устья до верховья. Устье реки находится на арктическом побережье, примерно посередине между м. Дежнева и м. Сердце-Камень. По руслу реки - ивняки. 6) Весной 2009 г. оленеводы видели 3-х рысей возле озера Куkenлигытгын (к северо-западу от озера Иони). 7) В 2007 г. охотники видели рысь в районе к северо-западу от залива Лаврентия. 8) В 2008 г. на мысе Нунямо видели рысь стандартного окраса с пятнами на теле и другую рысь - с однотонно серой окраской, без пятен. Здесь же нашли тушки погрызенных рысью зайцев.

Южная часть полуострова (Провиденский район). 1) Автор видел следы рыси на илистом грунте в русле реки Нунямовею, возле мыса Чирикова, в сентябре 1982 г. 2) Рысь была убита водителем вездехода зимой, в середине 80-х годов, в районе лагуны Имтук, к западу от бухты Провидения. 3) В начале 1990-х годов на озере Аччен зимой нашли мертвую рысь. Предположительно, погибла от голода. 4) В 1990-е годы неоднократно наблюдали рысь в бухте Пенкигней, в том числе с детенышем (наблюдатель А. Ашкамакин). Аналогичное сообщение от Павла Л.: рысь наблюдают регулярно, когда плавают на лодках летом в бухту Пенкигней. Место гористое. Горы с крутыми склонами к бухте, есть заросли ольховника и немного ивняка в устьях речек и по пологим склонам. Речки впадают в море в основном в вершине бухты. В этих местах обитают зайцы-беляки, куропатки, которые и служат, вероятно, основной пищей в наиболее трудное время - зимой. 5) Весной 2002 года нашли мертвую рысь в 3-4 км к северу от Энмелена. 6) В феврале 2002 года видели следы рыси в 100 км от Нунлиграна к северо-востоку. 7) Николай К. поймал рысь в капкан, установленный в сарае в бухте Преображения. 8) В 2006-2007 гг. рысь наблюдали оленеводы в кустах у реки Гетлянген, впадающей в одноименную лагуну. Это около 110 км к юго-

западу от залива Лаврентия.

Основные выводы:

1. По представленным сведениям (16 наблюдений с 1982 по 2010 годы), рысь наблюдается регулярно в разных районах Чукотского полуострова по меньшей мере с начала 80-х годов 20 века, т.е. около 30 лет.

2. Отмечены наблюдения рыси с детенышами, т.е. налицо размножение и, вероятно, круглогодичное обитание на ряде участков.

3. Охотники специально отмечают, что в ряде мест звери наблюдаются регулярно, каждое лето.

4. Отмечены две разновидности окраса: стандартная пятнистая и однотонная серая.

5. Есть конкретные наблюдения питания рыси зайцем-беляком (мыс Нунямо).

6. Основными лимитирующими факторами для рыси являются: ограниченность кормов зимой (заяц-беляк, возможна в питании тундряная куропатка), длинная зима, многоснежье.

7. Находки мертвых рысей - свидетельство бедственного состояния зверей, особенно зимой.

Следует особо отметить, что в тундре Чукотки заяц-беляк держится группами (20-40 голов) и большими скоплениями (до 100 и более особей). Совершает регулярные сезонные перекочевки. Соответственно, рысь может относительно благополучно перезимовывать при высокой численности зайца-беляка и на его скоплениях. В текущие зимы (2009, 2010 годы) охотники отмечают высокую численность зайца-беляка.

Авторы благодарят за предоставленную информацию Владимира и Евгения Эйнеучейвун.

СНЕЖНЫЕ БАРАНЫ НА ЧУКОТКЕ

Мымрин Р.Н., Мымрин Н.И.

г. Киров

ntymrin@yandex.ru

Евразия и Северная Америка были разделены около 10 тыс. лет назад при значительном повышении уровня моря и возникновении Берингова пролива (Чернявский, 1984). Произошло разделение наземных фаун. Однако сходство их животного населения до сих пор весьма велико, что и привлекает внимание многих исследователей. В настоящем сообщении приводятся собственные наблюдения на Чукотском полуострове за последние 20 лет, опросы охотников и литературные данные о распределении и численности одного из редких видов фауны России - снежного барана-толсторога. Аналог на Аляске - *Ovis dalli*.

Ф.Б. Чернявский (1984) указывает три очага обитания снежных баранов на Чукотском полуострове: 1. хребет Тэнканый (у западной окраины бухты Лаврентия); 2. в междуречье рек Чегитунь и Уиавээм в нижнем течении, невдалеке от северного побережья полуострова и 3. к северу от вершины бухты Провидения. В сборнике «Позвоночные животные Северо-Востока России» (1996) показано распределение толсторогов почти по всей южной половине Чукотского полуострова. Наши материалы подтверждают и дополняют приведенные выше сведения.

Северное побережье и прибрежные районы (Колючинская губа - мыс Дежнева). Охотники из села Энурмино видели баранов на горном массиве, образующем мыс Сердце-Камень, в количестве 5-6 голов.

Восточное побережье (мыс Дежнева - мыс Чукотский). Одного снежного барана отметили охотники в районе лагуны Поутен, севернее залива Лаврентия (ноябрь 1993 г). Охотники из села Лорино в 2002 году добыли барана к западу от речки Чульхевеем, у восточных отрогов горного массива Тэнканый. Двух баранов мы видели на пологом склоне у входа в бухту Пенкигней 30 июля 1996 г. Охотники из ближайшего к бухте чукотского села